Impfempfehlungen für Erwachsene OR-Info

Ab 18 Jahren

Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten

(3 fach) alle 10 Jahre bei Auslandsreisen eventuell mit Kinderlähmung(4 fach)

Grippe/Influenza Impfung

bei chronisch Kranken und eventuell Schwangeren und Menschen mit viel Personenkontakten

FSME (Zeckenbiss Gehirnhautentzündung) (2: 1-3 MON nach 1. Impfung – 3: 5-12 MON nach 2. Impfung)

Ab 60 Jahren zusätzlich

Grippe/Influenza Impfung jährlich

Gürtelrose besteht aus 2 maliger Impfung (bei besonderen Begleiterkrankungen ab 50 Jahren

(Shingrix 2. Impfung 2-6 MON nach 2. Impfung) wie z.B.: ▶ Angeborener oder erworbener Immundefizienz

- ► HIV-Infektion Rheumatoider Arthritis
- Systemischem Lupus erythematodes
- ▶ Chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen ▶ Chronisch obstruktive

Pneumokokken-Impfung gegen Erreger der

Lungenentzündung besonders empfohlen für Menschen mit Begleiterkrankungen (1 Impfung, eventuell Wiederholung alle 5 Jahre)

RSV Impfung - Das RS-Virus befällt die Atemwege und macht grippeähnliche Beschwerden. Man kann mehrmals im Leben an RSV erkranken. RSV wird empfohlen ab 75 Jahren und bei Person schweren Vorerkrankungen ab 60 Jahren. Infoblatt siehe QR-Code.











